

適応症

外陰部


閉経関連泌尿生殖器症候群

膣リジュビネーション

膣萎縮

腹圧性尿失禁


臨床写真



治療前



治療後



治療前



治療後

さらに多くの臨床写真を見るには



1. QRコードをスキャンしてください。
2. 「デバイス別に検索」メニューからSMAXELを選択してください。

よくあるご質問

治療時に痛みはありますか？

ほとんどの患者様は軽い温かさやピリピリとした感覚として感じます。麻酔は通常必要ありませんが、快適性を高めるために麻酔クリームを使用することも可能です。

回復期間はどのくらいですか？

ダウンタイムはほとんどありません。一部の患者様では1〜2日程度、軽い赤みや敏感さを感じる場合がありますが、施術直後から通常の日常生活に戻ることができます。

SMAXELは出産後や更年期にも使用できますか？


はい。SMAXELは、出産後や更年期前後に生じる膣の変化に悩む女性に適した治療です。快適性、機能性、そして自信の回復をサポートします。

もっと詳しく知りたいですか？

QRコードをスキャンしてください！



www.ids.co.kr



SMAXEL

女性の自信を引き出す、精密なケア


FDA CE

SMAXELとは何ですか？

SMAXELは、女性のウェルネスに関するさまざまな悩みに対して、優しく効果的な治療を提供する最先端のフラクショナルCO₂レーザーシステムです。

集中的なレーザーエネルギーを使用することで、膣領域におけるコラーゲン再構築と組織再生を促進し、手術やダウンタイムを必要とせずに、弾力性、潤い、そして総合的な膣の健康状態の改善をサポートします。

乾燥、弛緩、不快感などのお悩みがある方、または自信と快適さを取り戻したい方に向けて、SMAXELは幅広い年齢層の女性に適した、安全で非侵襲的なソリューションを提供します。



多彩なハンドピース

施術の流れ

施術前

- 医療従事者が症状、既往歴、治療目的を確認し、SMAXELが適した治療であるかを判断します。
- 施術は医療機関内で行われ、通常は麻酔を必要としません。

施術中

- 専用に設計された膣プローブを使用し、膣壁へフラクショナルCO₂レーザーエネルギーを照射します。レーザーによって制御された微細な刺激を与えることで、自然な修復反応を促進し、組織の引き締めやコラーゲン生成の増加をサポートします。
- 治療時間は約15～20分です。ほとんどの患者様は軽度の不快感のみで、温かさや軽いピリピリとした感覚として感じる人が多いです。

施術後

- ダウンタイムは基本的に必要ありませんが、数日間は性交渉やタンポンの使用を控えるよう推奨される場合があります。ほとんどの患者様は、施術直後から通常の日常生活へ戻ることができます。
- 治療目的や医療従事者の推奨に応じて、より良い結果を得るために、数週間の間隔をあけた2～3回の治療が推奨される場合があります。

SMAXELによる膣治療

瘢痕治療と同様に、フラクショナルCO₂レーザーによる膣リジュビネーション治療も同じ原理を利用しますが、ターゲットとなる組織と作用効果は膣組織に特化しています。

フラクショナルCO₂レーザーは、集中したレーザー光を数千個の微細なマイクロビームに分割して照射します。これらのマイクロビームは膣組織の深部に到達し、蒸散領域と凝固領域からなる制御された微細な熱作用部位を形成します。

この過程により組織の修復反応が促進され、新しいコラーゲンやエラスチン線維の生成、さらに膣壁における血管新生を促進します。

その結果、膣組織の強度や弾力性が向上し、膣のゆるみ、弾力性低下、乾燥感の改善につながります。治療後数週間にわたり、患者様は膣の引き締め感、潤滑性、そして全体的な組織状態の改善を実感する場合があります。

